

附件

古代经典名方关键信息表（“竹叶石膏汤”等 25 首方剂）

（1）竹叶石膏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	竹叶二把，石膏一斤，半夏半升（洗），麦门冬一升（去心），人参二两，甘草二两（炙），粳米半斤。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟，汤成去米，温服一升，日三服。	竹叶	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle. 的干燥叶	生品	27.60g	上七味，以水 2000mL，煮取 1200mL，去滓，入粳米煮熟，汤成去米，温服 200mL，日三服。	【功效】清热生津，益气和胃。 【主治】伤寒、温病、暑病余热未清，气津两伤证。症见身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，或虚烦不寐，舌红苔少，脉虚数。
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（CaSO ₄ ·2H ₂ O）	生品	220.00g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	106.00g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L. subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	110.00g		
备注	1.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如《中华人民共和国药典》1963年版麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自《中华人民共和国药典》1977年版起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分						

含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考《浙江省中药炮制规范》2015年版所规定的浙麦冬饮片规格入药。

2.据原方中煎煮法“煮取六升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/6。故本方每次的服药量为：竹叶 4.48g，石膏 36.67g，半夏 5.75g，麦冬 17.67g，人参 4.60g，甘草 4.60g，粳米 18.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。

(2) 麻黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	麻黄三两（去节），桂枝二两（去皮），甘草一两（炙），杏仁七十个（去皮尖）。上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	41.40g	上四味，以水1800mL，先煮麻黄至1400mL，去沫，加入余药，煮取500mL，去滓，温服160mL。	【功效】发汗解表，宣肺平喘。 【主治】外感风寒表实证。恶寒发热，头身疼痛，无汗而喘，舌苔薄白，脉浮紧。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	苦杏仁	25.90g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升半”“温服八合”，可知本方每服量为煎出总量的 $\frac{8}{25}$。故本方每次的服药量为：麻黄 13.25g，桂枝 8.83g，甘草 4.42g，苦杏仁 8.29g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(3) 小承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	大黄四两（酒洗）， 厚朴二两（炙，去皮）， 枳实三枚（大者，炙）。上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服。初服汤当更衣，不尔者，尽饮之，若更衣者，勿服之。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	酒大黄	55.20g	上三味，以水 800mL，煮取 240mL，去药渣，分 2 次温服。	【功效】轻下热结。 【主治】阳明腑实轻证。症见谵语潮热，大便秘结，胸腹痞满；或痢疾初起，腹中胀痛，里急后重者，舌苔老黄，脉滑而疾。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	27.60g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	麸炒枳实	41.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升二合”“分温二服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：大黄 27.60g，厚朴 13.80g，枳实 20.70g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(4) 当归四逆汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	当归三两，桂枝三两（去皮），芍药三两，细辛三两，甘草二两（炙），通草二两，大枣二十五枚（擘）。上七味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	41.40g	上七味，以水1600mL，煮取600mL，去药渣，每次温服200mL，日3次。	【功能】温经散寒，养血通脉。 【主治】血虚寒厥证。症见手足厥寒，或腰、股、腿、足、肩臂疼痛，口不渴，舌淡苔白，脉沉细。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥藤茎	生品	27.60g		

		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	75.00g		
备注	<p>1.汉代通草为今木通，且历代为多基原，优先推荐历代主流基原木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：当归 13.80g，桂枝 13.80g，白芍 13.80g，细辛 13.80g，甘草 9.20g，木通 9.20g，大枣 25.00g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(5) 桂枝芍药知母汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	桂枝四两，芍药三两，甘草二两，麻黄二两，生姜五两，白术五两，知母四两，防风四两，附子二两（炮）。上九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	55.20g	上九味，以水1400mL，煮取400mL，温服140mL，日3次。	【功效】祛风除湿，温经散寒，滋阴清热。 【主治】风湿历节。症见诸肢节疼痛，身体瘦弱，脚肿麻木，头眩短气，恶心欲吐，舌淡苔白，脉沉细。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	69.00g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	69.00g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	55.20g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	55.20g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品	黑顺片	27.60g		

备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升”“温服七合”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：桂枝 19.32g，白芍 14.49g，甘草 9.66g，麻黄 9.66g，生姜 24.15g，白术 24.15g，知母 19.32g，防风 19.32g，附子 9.66g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>
----	--

(6) 半夏厚朴汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	半夏一升，厚朴三两，茯苓四两，生姜五两，干苏叶二两。上五味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	69.00g	上五味，以水1400mL，煎至800mL，温服200mL，日3次、夜1次服。	【功效】行气散结，降逆化痰。 【主治】梅核气郁痰阻证。症见咽中如有物阻，咯吐不出，吞咽不下，胸胁满闷，或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或弦滑。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	41.40g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.20g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	69.00g		
		紫苏叶	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶	生品	27.60g		
备注	<p>1.原方明确为紫苏叶，因此推荐其药用部位为叶。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煮取四升”“温服一升”“分温四服，日三夜一服”，可知本方每服量为煎出总量的1/4。故本方每次的服药量为：半夏17.25g，厚朴10.35g，茯苓13.80g，生姜17.25g，紫苏叶6.90g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1~4次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(7) 百合地黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	百合七枚(擘)， 生地黄汁一升。上 以水洗百合，渍一 宿，当白沫出，去 其水，更以泉水二 升，煎取一升，去 滓，内地黄汁，煎 取一升五合，分温 再服。中病，勿更 服，大便当如漆。	百合	百合科植物百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 的新鲜鳞叶	鲜品	245.00g	百合以水 400mL，煮 取 200mL，纳 地黄汁，煮 取 300mL，分 两次温服。	【功效】养阴清 热，补益心肺。 【主治】百合病 心肺阴虚证。症 见神志恍惚，沉 默寡言，坐卧不 宁，欲食不能食， 自觉时寒时热， 口苦，小便赤， 大便干，舌红少 苔，脉细数。
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia</i> <i>glutinosa</i> Libosch.的新鲜块根	鲜品榨汁	200mL		
备注	<p>1.生地黄汁以地黄鲜品洗净后不加水等辅料，直接榨汁而成。</p> <p>2.据原方中煎煮法“煎取一升五合，分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：百合 122.50g，地黄汁 100mL，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(8) 枳实薤白桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	枳实四枚，厚朴四两，薤白半斤，桂枝一两，瓜蒌实一枚（捣）。上五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	55.20g	上五味药，以水1000mL，先煮枳实、厚朴，煮取400mL，去渣，入余药，煮数沸，分3次温服。	【功效】行气祛痰，通阳散结。 【主治】胸痹，胸阳不振、痰气互结证。症见胸满而痛，甚或胸痛彻背，喘息咳嗽，短气，气从胁下冲逆，上攻心胸，舌苔白腻，脉沉弦或紧。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	55.20g		
		薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge.的干燥鳞茎	生品	110.00g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	13.80g		
		瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟果实	生品	60.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的1/3。故本方每次的服药量为：枳实18.40g，厚朴18.40g，薤白36.67g，桂枝4.60g，瓜蒌20.00g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1~3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(9) 厚朴麻黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》 (汉·张仲景)	厚朴五两，麻黄四两，石膏如鸡子大，杏仁半升，半夏半升，干姜二两，细辛二两，小麦一升，五味子半升。上九味，以水一斗二升，先煮小麦熟，去滓，内诸药，煮取三升，温服一升，日三服。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	69.00g	上九味，以水2400mL，先煮小麦至熟，去渣，加入余药，煮取600mL，温服200mL，日3服。	【功效】宣肺化饮，清肺化痰，降气平喘。 【主治】表寒里饮证。症见咳嗽痰多，喘而胸满，不能平卧，咽喉不利，喉中有哮鸣音，舌苔滑，脉浮或滑。
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	55.20g		
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	生品	90.00g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	苦杏仁	57.00g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	27.60g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum</i>	生品	27.60g		

			<i>sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎				
		小麦	禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L.的干燥果实	生品	140.00g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实	生品	37.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：厚朴 23.00g，麻黄 18.40g，石膏 30.00g，苦杏仁 19.00g，半夏 11.50g，干姜 9.20g，细辛 9.20g，小麦 46.67g，五味子 12.33g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(10) 当归建中汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《千金翼方》 (唐·孙思邈)	当归四两，桂心三两，甘草二两（炙），芍药六两，生姜三两，大枣十二枚（擘）。右六味，㕮咀，以水一斗，煮取三升，分为三服，一日令尽。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	55.20g	上六味，粉碎为粗粒，以水2000mL，煮取600mL，分三次温服，一日服尽。	【功效】温中补虚，缓急止痛。 【主治】产后虚羸不足。症见腹中疝痛，少气，或小腹拘急挛痛引腰背，不能饮食，舌淡苔薄白，脉弱。
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	82.80g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎煮法“煮取三升”“分为三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：当归 18.40g，肉桂 13.80g，甘草 9.20g，白芍 27.60g，生姜 13.80g，大枣 12.00g，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(11) 槐花散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《普济本事方》（宋·许叔微）	槐花（炒），柏叶（烂杵焙），荆芥穗，枳壳（去穰细切，麸炒黄）。右修事了，方秤等分，细末，用清米饮调下二钱，空心食前服。	槐花	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L.的干燥花	炒槐花	2.07g	上药粉碎为细末，每服8.26g，饭前用米汤调服。	【功效】清肠止血，疏风行气。 【主治】肠风脏毒下血。症见便前出血，或便后出血，或粪中带血，血色鲜红或晦暗，舌质红，脉数或弦数。
		侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的新鲜枝梢和叶	捣烂，焙	2.07g		
		荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuisfolia</i> Briq.的干燥花穗	生品	2.07g		
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实	麸炒枳壳	2.07g		
备注	<p>1.侧柏叶原方注明经过捣烂再焙干，似描述的为新鲜侧柏叶经过处理的过程，否则干燥的侧柏叶即便杵烂，也不需要干燥处理。因此建议来源为新鲜侧柏叶，炮制根据原方要求“捣烂，焙”，可参考地方标准的《安徽省中药炮制规范》2005年版中的焙法。</p> <p>2.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为24.78g，各药的日服量折算如下：槐花6.20g，侧柏叶（按炮制后干品计算）6.20g，荆芥穗6.20g，枳壳6.20g。</p>						

(12) 升阳益胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《脾胃论》 (金·李东垣)	黄芪二两，半夏（汤洗）、人参（去芦）、甘草（炙）各一两，防风、白芍药、羌活、独活各五钱，橘皮（连穰）四钱，茯苓、泽泻、柴胡、白术各三钱，黄连二钱。上咬咀，每服三钱，生姜五片，枣二枚，去核，水三盏，同煎至一盏，去渣，温服，早饭、午饭之间服之，禁忌如前。其药渐加至五钱止。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	82.60g	上药粉碎成粗粒，每服取 12.39g，以水 900mL，生姜 5.00g，大枣 6.00g，煮取 300mL，早、午饭之间温服。渐加至每服 20.65g。	【功效】益气升阳，清热除湿。 【主治】脾胃虚弱，湿热内停证。症见饮食无味，食不消化，口燥舌干，腹胀，乏力，怠惰嗜卧，肢体困重，面色皤白，大便溏泄，小便频数，或兼见畏风恶寒，舌淡苔白腻，脉缓无力。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	41.30g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根	生品	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.30g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	20.65g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	20.65g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎	生品	20.65g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	20.65g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及	生品	16.52g		

			其栽培变种的干燥成熟果皮				
	茯苓		多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	12.39g		
	泽泻		泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	12.39g		
	柴胡		伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	12.39g		
	白术		菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	12.39g		
	黄连		毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	8.26g		
	生姜		姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	5.00g		
	大枣		鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	6.00g		
备注	本方的最大日服量为五钱，即 20.65g，各药的日服量折算如下：黄芪 4.69g，半夏 2.35g、人参 2.35g、甘草 2.35g，防风 1.17g、白芍 1.17g、羌活 1.17g、独活 1.17g，陈皮 0.94g，茯苓 0.70g、泽泻 0.70g、柴胡 0.70g、白术 0.70g，黄连 0.47g，另加生姜 5.00g，大枣 6.00g。						

(十三) 当归六黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《兰室秘藏》 (金·李东垣)	当归、生地黄、熟地黄、黄柏、黄芩、黄连各等分，黄芪加一倍。上为粗末，每服五钱，水二盏，煎至一盏，食前服。小儿减半服之。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	2.58g	上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水600mL，煮取300mL，饭前服用，小儿减半服用。	【功效】滋阴泻火，固表止汗。 【主治】盗汗阴虚火旺证。症见发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数。
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	生品	2.58g		
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品	熟地黄(蒸法)	2.58g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮	生品	2.58g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	2.58g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	2.58g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	5.16g		
备注	本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为61.95g，各药的日服量折算如下：当归、地黄、熟地黄、黄柏、黄芩、黄连各7.74g，黄芪15.49g。						

(十四) 厚朴温中汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《内外伤辨惑论》（金·李东垣）	厚朴（姜制）、橘皮（去白）各一两，甘草（炙）、草豆蔻仁、茯苓（去皮）、木香各五钱，干姜七分。上为粗散，每服五钱匕。水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，温服，食前。忌一切冷物。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	41.30g	上药粉碎成粗粒，每服20.65g，以水600mL，生姜9.00g，煮取300mL，饭前温服。	【功效】行气除满，温中燥湿。 【主治】脾胃气滞寒湿证。症见脘腹胀满，或疼痛，不思饮食，四肢倦怠，舌苔白或白腻，脉沉弦。
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
		草豆蔻	姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子	生品	20.65g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	20.65g		
		木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根	生品	20.65g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	2.89g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	9.00g		

备注	本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：厚朴 15.22g、橘红 15.22g，甘草 7.61g、草豆蔻 7.61g、茯苓 7.61g、木香 7.61g，干姜 1.07g，另加生姜 27.00g。
----	---

(十五) 玉女煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	生石膏三、五钱，熟地三、五钱或一两，麦冬二钱，知母、牛膝各一钱半。水一盅半，煎七分，温服或冷服。	石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ ·2H ₂ O)	生品	14.92g	上药加水300mL，煎至140mL，温服或冷服。	【功效】清胃热，滋肾阴。 【主治】胃热阴虚证。症见头痛，牙痛，齿松牙衄，烦热干渴，或消渴，消谷善饥，舌红苔黄而干，脉浮洪或滑。
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	熟地黄(蒸法)	24.25g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	7.46g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	5.60g		
		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.的干燥根	生品	5.60g		
备注	药物剂量为区间者，取中间值。方中熟地黄取三钱至一两之间，故取中间值为六钱半，即 24.25g。						

(十六) 保阴煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	生地、熟地、芍药各二钱，山药、川续断、黄芩、黄柏各一钱半，生甘草一钱。水二盅，煎七分。食远温服。	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	7.46g	上药加水400mL，煎至140mL，食远温服。	【功效】滋阴清热，固冲止血。 【主治】阴虚内热动血证。症见带下淋浊，色赤带血，血崩便血，月经先期，舌红苔黄，脉滑数。
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄 (蒸法)	7.46g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	7.46g		
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb.的干燥根茎	生品	5.60g		
		续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根	生品	5.60g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	5.60g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮	生品	5.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1~3剂遵医嘱使用。						

(十七) 化肝煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》（明·张景岳）	青皮、陈皮各二钱，芍药二钱，丹皮、栀子（炒）、泽泻各一钱半，土贝母二、三钱。水一盅半，煎七、八分。食远温服。	青皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥未成熟果实的果皮	生品	7.46g	上药加水300mL，煎至150mL，食远温服。	【功效】疏肝解郁，清肝泻火。 【主治】肝郁化火证。症见烦躁易怒，胁肋胀痛，或有动血征象，舌红苔黄，脉弦或弦数。
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	7.46g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	7.46g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮	生品	5.60g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	炒栀子	5.60g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	5.60g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎	生品	9.33g		
备注	<p>1.本方中土贝母为该书作者所在地（浙江）土产贝母，即今百合科植物浙贝母。</p> <p>2.本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1~3剂遵医嘱使用。</p>						

(十八) 固阴煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》（明·张景岳）	人参随宜，熟地三、五钱，山药二钱（炒），山茱萸一钱半，远志七分（炒），炙甘草一、二钱，五味子十四粒，菟丝子二、三钱（炒香）。水二盅，煎七分，食远温服。	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	7.46g	上药加水400mL，煎至140mL，食远温服。	【功效】滋补肝肾，固涩调经。 【主治】肝肾阴虚证。症见妇人崩漏、带下、产后恶露不止、阴挺及男子遗精滑泄，舌淡苔少，脉细或弱。
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	熟地黄（蒸法）	14.92g		
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	清炒山药	7.46g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉	生品	5.60g		
		远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	制远志	2.61g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	5.60g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	2.00g		
		菟丝子	旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子	炒菟丝子	9.33g		
备注	<p>1. 人参未明确具体用量，在张景岳《景岳全书》中多取2钱，故本方中亦取人参2钱，即7.46克。</p> <p>2. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1~3剂遵医嘱使用。</p> <p>3. 清炒山药、炒菟丝子参照《中国药典》2020年版中清炒法。</p>						

(十九) 清骨散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《证治准绳》 (明·王肯堂)	银柴胡一钱五分，胡黄连、秦艽、鳖甲（醋炙）、地骨皮、青蒿、知母各一钱，甘草五分。水二盅，煎八分，食远服。	银柴胡	石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根	生品	5.60g	上药加水400mL，煎至160mL，食远服。	【功效】清虚热，退骨蒸。 【主治】肝肾阴虚，虚火内扰证。症见骨蒸潮热，或低热日久不退，形体消瘦，唇红颊赤，困倦盗汗，或口渴心烦，舌红少苔，脉细数。
		胡黄连	玄参科植物胡黄连 <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell 的干燥根茎	生品	3.73g		
		秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. 的干燥根	生品	3.73g		
		鳖甲	鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲	醋鳖甲	3.73g		
		地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill 的干燥根皮	生品	3.73g		
		青蒿	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分	生品	3.73g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	生品	3.73g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.87g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

(二十) 达原饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《瘟疫论》 (明·吴又可)	槟榔二钱，厚朴一钱，草果仁五分，知母一钱，芍药一钱，黄芩一钱，甘草五分。右用水一盅，煎八分，午后温服。	槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥成熟种子	生品	7.46g	上药加水400mL，煎至160mL，午后温服。	【功效】 开达膜原，辟秽化浊。 【主治】 温疫或疟疾，邪伏膜原证。症见憎寒壮热，发无定时，胸闷呕恶，头痛烦躁，舌苔垢腻，或苔白厚如积粉，脉弦数。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	3.73g		
		草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	草果仁	1.87g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	3.73g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	3.73g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	3.73g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.87g		
备注	1.根据《瘟疫论》原书及后世的《瘟疫论补注》等版本记载，本方加水量多为“水二钟（盅）”，故以此折算。 2.本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1~3剂遵医嘱使用。						

(二十一) 沙参麦冬汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》 (清·吴瑭)	沙参三钱，玉竹二钱，生甘草一钱，冬桑叶一钱五分，麦冬三钱，生扁豆一钱五分，花粉一钱五分。水五杯，煮取二杯，日再服。	南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch.或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq.的干燥根	生品	11.19g	上药加水1000mL，煎至400mL，日2服。	【功效】清养肺胃，生津润燥。 【主治】燥伤肺胃阴分证。症见咽干口渴，或身热，或干咳少痰，舌红少苔，脉细数。
		玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎	生品	7.46g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
		桑叶	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶（霜降后采收）	生品	5.60g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	11.19g		
		白扁豆	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的干燥成熟种子	生品	5.60g		
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	5.60g		
备注	<p>1.鉴于本方明确冬桑叶，为历代推崇，且现代研究证明采收时间对桑叶所含成分影响较大，因此建议霜降后采收入药。</p> <p>2.本方未明确是日剂量还是单次剂量，建议结合临床实际，日1~3剂遵医嘱使用。</p>						

(二十二) 完带汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 (清·傅山)	白术一两(土炒), 山药一两(炒), 人参二钱,白芍五钱(酒炒), 车前子三钱(酒炒), 苍术三钱(制), 甘草一钱,陈皮五分, 黑芥穗五分, 柴胡六分。水煎服。	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	土炒白术	37.30g	水煎服	【功效】补脾疏肝,化湿止带。 【主治】带下病,肝郁脾虚、湿浊下注证。症见带下色白或淡黄,清稀无臭,面色㿔白,倦怠便溏,舌淡苔白,脉缓或濡弱。
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	清炒山药	37.30g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	7.46g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	酒白芍	18.65g		
		车前子	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 的干燥成熟种子	酒车前子	11.19g		
		苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎	麸炒苍术	11.19g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	3.73g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	1.87g		
		荆芥穗炭	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuisfolia</i> Briq. 的干燥花穗	荆芥穗炭	1.87g		
柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	2.24g				

备注	土炒白术建议参考《全国中药饮片炮制规范》1988年版中方法炮制。
----	----------------------------------

(二十三) 身痛逐瘀汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医林改错》 (清·王清任)	秦艽一钱，川芎二钱，桃仁三钱，红花三钱，甘草二钱，羌活一钱，没药二钱，当归三钱，灵脂二钱（炒），香附一钱，牛膝三钱，地龙二钱（去土）。水煎服。	秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana. macrophylla</i> Pall.的干燥根	生品	3.73g	水煎服	【功效】活血行气，祛瘀通络，通痹止痛。 【主治】瘀血痹阻经络证。症见肩痛、臂痛、腰痛、腿痛，或周身疼痛，痛如针刺，经久不愈，舌质黯或有瘀斑，脉涩。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	7.46g		
		桃仁	蔷薇科植物山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	生品	11.19g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	7.46g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	3.73g		
		没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl.的干燥树脂	生品	7.46g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	11.19g		
		五灵脂	鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edward 的干燥粪便	醋五灵脂	7.46g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的	生品	3.73g		

			干燥根茎				
		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根	生品	11.19g		
		地龙	钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier)的干燥体	生品	7.46g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

(二十四) 五味消毒饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医宗金鉴》 (清·吴谦)	金银花三钱，野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子各一钱二分。水二盅，煎八分，加无灰酒半钟，再滚二、三沸时，热服。渣，如法再煎服，被盖出汗为度。	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.的干燥花蕾或带初开的花	生品	11.19g	上药加水400mL，煎至160mL，加黄酒100mL，再煮沸二、三次。热服。	【功效】清热解毒，消散疔疮。 【主治】痈疮疔肿，火毒蕴肤证。症见发热恶寒，局部红肿热痛，舌红苔黄，脉数。
		野菊花	菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L.的干燥头状花序	生品	4.48g		
		蒲公英	菊科植物蒲公英 <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand. -Mazz.的干燥全草	生品	4.48g		
		紫花地丁	堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草	生品	4.48g		
		紫背天葵子	毛茛科植物天葵 <i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino 的干燥块根	生品	4.48g		
		黄酒	参考国家标准 GB/T 13662-2018 传统型黄酒（以糯米 <i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> 为原料）		100mL		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

(二十五) 散偏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《辨证录》 (清·陈士铎)	白芍五钱，川芎一两，郁李仁一钱，柴胡一钱，白芥子三钱，香附二钱，甘草一钱，白芷五分。水煎服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	18.65g	水煎服	【功效】 疏肝解郁，活血止痛。 【主治】 偏头痛。症见半边头痛，时轻时重，遇风寒及情志不畅加重，舌质淡暗，脉沉弦。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	37.30g		
		郁李仁	蔷薇科植物欧李 <i>Prunus humilis</i> Bge.或郁李 <i>Prunus japonica</i> Thunb.的干燥成熟种子	生品	3.73g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	3.73g		
		白芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L.的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎	生品	7.46g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
		白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	1.87g		
备注							

注：由于剂型和煎煮法不同，表中各药折算剂量与备注中的日服量可能存在差异（由小数点进位导致），建议以备注中各药的日服量折算结果进行研发。